

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE POLYHIRMA
DE L'AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE (COL. CARABIDÆ),

PAR M. G. BÉNARD.

Polyhirma Somereni nov. sp.

♂ Insecte très élancé de forme élégante et svelte, à tête, pronotum et élytres d'un noir assez brillant.

Tête plus longue que large, déprimée entre les yeux où elle pré-



Fig. 1. — *Polyhirma Somereni* nov. sp.

sente une protubérance allongée commençant à la hauteur des yeux et se prolongeant jusqu'à la base du labre; surface de la tête ornée de soies couchées légèrement jaunâtres; tempes courtes et très arrondies; labre brillant, très convexe à dépression basale bien marquée, portant à son bord antérieur quatre pores pilifères

Pronotum allongé, cordiforme, peu convexe, grossièrement et irrégulièrement ponctué, marqué d'impressions profondes à la base des côtés, largement sillonné au milieu et garni d'un feutrage semblable à celui de la tête; gouttière latérale large, garnie de soies de même nature.

Écusson peu visible, caché en partie par le feutrage de la bande scutellaire.

Élytres très allongés, peu convexes, légèrement déclives vers le sommet, marqués : 1° d'une bande scutellaire étroite, terminée à l'extrémité par une tache très régulièrement arrondie; cette ornementation garnie d'un même feutrage que celui de la bande thoracique est égale en longueur à un peu plus de la moitié des élytres; 2° chacun des élytres est orné de cinq côtes brillantes, minces, tranchantes et très légèrement sinueuses; les deux côtes longeant de chaque côté la bande scutellaire s'élargissent très sensiblement à la hauteur de l'extrémité de cette dernière et en regard de la tache terminale, ensuite, suivant toujours la ligne suturale elles se rétrécissent et convergent pour atteindre le sommet des élytres.

Les intervalles entre les côtes sont larges et garnis de nombreux alvéoles profonds et de forme rectangulaire; les deux intervalles situés sur chacun des élytres, entre les côtes quatre et cinq présentent vers le sommet un embryon de côte. Bordure latérale garnie de soies de même couleur que celles de la bande scutellaire, s'épaississant à l'extrémité et formant sur chacun des élytres une tache feutrée triangulaire envahissant une grande partie du sommet mais s'arrêtant de chaque côté à une courte distance de la ligne suturale.

Côtés du prosternum revêtus de soies couchées d'un blanc légèrement jaunâtre; les pièces méso et métathoraciques sont ornées d'une pilosité analogue; les pattes qui sont longues et grêles sont également munies d'une pubescence semblable.

Long. : ♂, 22 millimètres.

Par son facies général, cette nouvelle espèce se rapproche du *Polyhirma spatulata* Gerst., mais elle en diffère par la taille beaucoup plus petite, par la sculpture des alvéoles et surtout par la forme de la bande scutellaire qui chez *Polyhirma spatulata*, s'élargit au sommet en forme de spatule tandis que chez *Polyhirma Somereni* l'extrémité de la bande scutellaire est terminée par une tache feutrée très nettement arrondie.

Types ♂ au Kapete Museum, à Nairobi, et au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris.

Habitat : Afrique orientale anglaise; Kiu. (Dr V. G. L. Van Someren à qui nous sommes heureux de dédier cette espèce).